

Karantinmečio atradimas Obelynėje – Kaliforninė cūga

Obelynėje senai auga kaliforninė cūga (*Tsuga heterophylla*), tik mes jos nepažinome.

Kad geriau įsidėmėtume požymius ir nesumaišytume su kanadine cūga, palyginimui pateikiu abiejų cūgų fotografijas su pagrindiniais požymių skirtumų aprašymais (1 lentelė).



1 pav. Kairėje – kaliforninė cūga, dešinėje - kanadinė cūga

Ryškiausi skirtumai atrandami analizuojant spyglius, jų išsidėstymą, spalva. Mažesni, bet pakankamai ryškūs lyginant kankorėžius.

Lentelė: Ryškiausi skirtumai

Požymiai skirtumams rasti	Kanadinė cūga	Kaliforninė cūga
Spyglių prisisegimo kampas ūglio atžvilgiu	Spygliai beveik statmenai išsidėstę	Spygliai išsidėstę smailesniu kampu, palinkę link viršūnėlės.
Spyglių išsidėstymas	Spyglių tvarkingesnis šukiškas išsidėstymas	Spygliai labiau pasišiaušę, ne taip tvarkingai pasiskirstę
Spyglių spalva	Sodriai tamsiai žali, žvilga	Šviesiau žali.
Spyglio forma	Plokščias, lygus	Plokščias, bet persisukęs
Kankorėžiai	Kankorėžio viršūnė platesnė, žvyneliai stambesni	Kankorėžis nulaibėjęs viršuje, sunokę plačiau atsivėrę.



2 pav. Kanadinės (kairėje 1, 2) ir Kaliforninės (dešinėje 3,4) atsivėrę kankorėžiai



3 pav. Kanadinės ir kaliforninės cūgų spyglių apatinė pusė



4 pav. Spyglių viršutinė pusė



5 Pav. Kanadinės (kairėje) ir kaliforninės (dešinėje) cūgų kamienai Obelynėje



6 pav. Kanadinė (kairėje) ir kaliforninė (dešinėje) cūgos Obelynėje